

Maladies

Stemphyliose

La stemphyliose est présente principalement sur des 2èmes pousses ou des arrêts de récolte précoces. Sur des 2èmes pousses mal protégées, elle se développe sur les ramifications avec plus de 3 taches par rameau. Selon la modélisation (Cf. BSV), le risque est moyen en Loir-et-Cher et faible en Indre-et-Loire et Loiret.



Stemphylium sur rameau

Photos LCA

Renouveler la protection si l'intervention précédente est antérieure au 25 juin pour l'Indre-et-Loire et le Loiret. au 30 juin pour le Loir-et-Cher .

- A ce stade, préférer SWITCH (Cyprodinil + Fludioxonil) 1 Kg/ha, (au maximum 3 applications).
- Si une application de ce produit a déjà été effectuée, utiliser ORTIVA 1 l/ha (Azoxystrobine), (au maximum 3 applications) sur les parcelles saines ou ORTIVA TOP 1 l/ha (Difénoconazole + Azoxystrobine) sur les parcelles contaminées.
- SIGNUM sera à prévoir pour le passage suivant (début août).

Les parcelles avec des écartements de rangs supérieurs à 2.30 m ou orientées dans le sens des vents dominants sont moins sensibles grâce à une meilleure aération du feuillage.

Ravageurs

Criocères

Quelques adultes restent visibles, notamment dans le Loiret. Toutefois, les infestations sont en forte diminution. Les populations sont quasi nulles sur la plupart des parcelles.

Il n'est plus nécessaire d'intervenir sur la plupart des parcelles.

Il n'existe pas de solutions alternatives contre ce ravageur.