



BETTERAVE SUCRIERE

EN BREF

- Dernier BSV de la campagne

Rédacteurs

Bulletin rédigé par
l'Institut Technique de la
Betterave.

Observateurs

ITB Centre-Val de Loire,
GEETA Pithiviers, Cristal
Union, Ouvre et fils,
Tereos, Axereal,
Coopérative de
Boisseaux, Coopérative
de Puiseaux, Soufflet
Agriculture, Traitaphyt,
agriculteurs.

Directeur de publication :

Philippe NOYAU
Président de la Chambre
régionale d'agriculture du
Centre-Val de Loire

**13 avenue des Droits de
l'Homme – 45921 ORLEANS**

Ce bulletin est produit à
partir d'observations
ponctuelles. Il donne une
tendance de la situation
sanitaire régionale, qui ne
peut pas être transposée
telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale
d'agriculture du Centre-Val
de Loire dégage donc toute
responsabilité quant aux
décisions prises par les
agriculteurs pour la
protection de leurs cultures.

*Action du plan Ecophyto
piloté par les ministères en
charge de l'agriculture, de
l'écologie, de la santé et de
la recherche, avec l'appui
technique et financier de
l'Office français de la
Biodiversité*

Ravageurs

JAUNISSE

Une carte avec l'évolution de la jaunisse dans en région Centre Val de Loire est en cours de réalisation. Des secteurs ont été repérés avec de nombreuses parcelles NNI et non NNI présentant des symptômes de jaunisse.


Sur 273 parcelles enquêtées, 29 parcelles marquent des symptômes de jaunisse, dont 12 parcelles sont estimées à au moins 10 % de jaunisse.



TEIGNES

A la veille des arrachages, ce ravageur n'est plus à gérer par une intervention.

Malgré un grand nombre de piqûres observé sur les pétioles pendant l'été, seulement 53 % signalent des galeries dans le collet, le nombre de galeries par betterave touchée ne dépasse pas 1.



Maladies foliaires

Vous retrouvez ici les **dates préconisées d'arrêt des traitements** fongicides.

Selon votre date de récolte prévue et le délai avant récolte des produits, **vous devez adapter votre protection fongicide**.

Veillez à tenir compte des Délais Avant Récolte (DAR) des produits fongicides. Plus d'informations sur le « pense betterave 2022 », page 19 sur le site de l'ITB. Cliquez [ici pour le consulter](#).

De plus, une protection fongicide à moins de 45 jours de la récolte est rarement valorisée.

Maladies observées	Date de récolte prévue	Variété peu sensible	Variété sensible à très sensible
Oïdium/ Rouille	Avant la mi-octobre	Mi-août	Fin août
	Après la mi-octobre	Fin août	
Cercosporiose/ Ramulariose	Avant la mi-octobre	Fin août	1 ^{ère} quinzaine de septembre
	Après la mi-octobre	1 ^{ère} quinzaine de septembre	

CERCOSPORIOSE

A ce jour, nous préconisons l'arrêt des interventions sur cercosporiose.

Au-delà du 15 septembre, comme illustré ci-contre, le choix d'une variété résistante reste le moyen le plus sûr pour lutter efficacement contre la cercosporiose en cas d'arrachage tardif. Cette photo a été prise dans le Gâtinais le 12 septembre 2022, aucune protection fongicide n'a été appliquée.

