

MES LEGUMES



Mes jeunes oignons ou mes échalotes sont déformés

© LCA



Dégâts de mineuse sur oignon botte

DIAGNOSTIC



A l'automne, vous avez déjà observé des vers au sein des poireaux qui créent des galeries au sein des fûts (voir [fiche « j'ai des vers dans mes poireaux ! »](#)).

Le même ravageur peut provoquer des dégâts au printemps sur oignon ou sur échalote et dans une moindre mesure sur ail ou sur pépinière de poireau.

En effet, ces mouches ont deux périodes d'activité, l'une au printemps, l'autre à l'automne. Au printemps, elles recommencent un nouveau cycle en allant pondre sur les alliums présents à proximité. En se développant, l'asticot va provoquer des déformations du feuillage souvent visible sur oignon blanc ou sur échalote.



CONSEILS

La lutte s'effectue par la pose de filets de protection dès l'émergence des feuilles en prenant les précautions suivantes :

- Il ne doit pas y avoir de trous dans le filet ou sur les côtés (filet usagé, mal posé, se soulevant avec le vent,...)
- Il ne doit pas y avoir eu d'Alliacées au même endroit l'année précédente.

Les filets anti-insecte (filet à maille fine, léger, voir fiche mineuse) sont à privilégier. Ils peuvent être posés à plat sans arceaux. Ils seront retirés à la fin de l'activité de printemps, généralement vers la mi-mai.

Les produits de traitements contre le « ver du poireau » seront totalement inefficaces sur ces vers. Ils sont destinés à la teigne qui est un papillon (voir fiches respectives).



© LCA

Jeune échalote sous filet de protection