

J'ai des vers dans mes poireaux



Pupes et galeries dans le fût du poireau.



Piqures de nutrition sur feuille de ciboulette

DIAGNOSTIC



Chaque année, à partir de novembre, vous trouvez des vers qui ont fait des galeries dans le fût des poireaux. Alors que faire pour éviter cela ?

Le ravageur responsable de vos dégâts est la mineuse des Alliums. C'est une mouche dont la larve (l'asticot) attaque toutes les plantes de la famille du poireau : oignons, échalotes, ciboulettes, et poireaux. Les asticots et les pupes observés à l'automne correspondent à des pontes réalisées en septembre-octobre (voir cycle complet sur la [fiche « J'ai des vers dans mes poireaux »](#)).

Attention, il ne faut pas confondre ces vers avec la Teigne. La chenille de cette dernière ne pénètre pas dans le fût mais reste au niveau du feuillage. (voir [article dans « Je protège mon Jardin » n°6](#)).

Au moment des pontes, cette mouche laisse une trace de son passage qui est plus facilement détectable sur ciboulette : les piqures de nutrition (cf. photo). Ces piqures sont le signal que la ponte de la mouche est imminente. Généralement, l'activité de la mouche démarre aux alentours du mois de septembre et s'achève fin octobre ou début novembre. Le suivi de l'activité de la mineuse est réalisé par les professionnels et est consultable dans le BSV Légumes de la région Centre Val de Loire.



CONSEILS

La lutte consistera à empêcher la mouche de pondre au sein du poireau. Pour cela, la pose d'un filet de protection sera réalisée dès le début de l'activité de ponte, c'est-à-dire dès l'observation des piqures de nutrition et en prenant les précautions suivantes :

- Il ne doit pas y avoir de trous dans le filet ou sur les côtés (filet usagé, mal posé, se soulevant avec le vent,...)
- Il ne doit pas y avoir eu d'Allium au même endroit l'année précédente.

Les filets anti-insectes (filet à maille fine, léger, voir fiche « J'ai des vers dans mes poireaux ») sont à privilégier. Ils peuvent être posés à plat sans arceaux.

Ils seront retirés début novembre à la fin de l'activité de ponte. Leur maintien sur les poireaux sur une durée trop longue peut favoriser les maladies hivernales.

Rappel : Les produits contre le « ver du poireau » sont totalement inefficaces sur ces vers. Ils sont destinés à la teigne qui est un papillon et non une mouche.