

MES FLEURS ET MES ARBUSTES



J'ai des chenilles processionnaires dans mes conifères

© FREDON CVL



Présence de cocons blancs, visible en hiver, dans un pin trahissant la présence des chenilles processionnaires du pin.

DIAGNOSTIC



Si vous possédez des pins ou des cèdres et qu'en hiver, vous observez des cocons blancs sur vos conifères alors c'est que la chenille processionnaire du pin a élu domicile dans votre terrain !

Ce n'est pas tant les défoliations qu'elle occasionne sur les arbres qui la rend tristement célèbre mais les démangeaisons parfois virulentes qu'elle provoque en hiver et au printemps. En effet, **il s'agit d'une chenille urticante qui, lorsqu'elle se sent en danger, libère des poils microscopiques très urticants. En cas de contact avec la peau, ou les muqueuses, des réactions allergiques parfois graves peuvent survenir.**



CONSEILS

Il existe plusieurs solutions pour vous débarrasser des chenilles processionnaires du pin. En été (juin-juillet-août), c'est le vol des papillons. Contrairement aux chenilles, ils ne sont pas urticants, ouf !!! vous pouvez donc sans danger, disposer des pièges à phéromones dans vos conifères pour les capturer.

Placer dès le mois de juin, un piège à phéromone dans ou à proximité de vos conifères que vous souhaitez protéger. Plusieurs sortes de pièges existent : des pièges à entonnoir ou des pièges delta. Les pièges sont à placer à une hauteur minimale de 2 à 3 m et sur des supports (poteaux, branches...) parfaitement dégagés afin que le papillon accède facilement au piège.



A gauche, un piège à entonnoir ; à droite un piège delta

© FREDON CVL



© FREDON CVL

Pose d'un piège entonnoir sur un pin début juin

Concernant les densités :

- Arbres d'alignement : 1 piège tous les 25 m.
- Arbres en bosquet : au minimum 3 à 4 pièges à positionner sur le pourtour du bosquet.
- Arbre isolé : 1 piège si possible à placer sur un autre arbre ou autre support à moins de 20 m.
- Pour une forêt de pin, compter en moyenne 7 pièges par hectare.

Vous pouvez conserver les phéromones au frigo ou mieux au congélateur (bien séparer des denrées alimentaires). Selon les fabricants, elles sont attractives entre 1 et 3 mois (se reporter à la notice du distributeur) . En cas de manipulation, penser à vous munir de gants.