

## sommaire

---

<b>FRAISIERS</b> .....	<b>2</b>
<b>FRAISIERS JOURS COURTS</b> .....	<b>2</b>
<b>FRAISIERS REMONTANTS</b> .....	<b>3</b>

---

Bulletin rédigé par CA45 / CA41 / CA37 / Fdgdon 37 / Fredon Centre, avec les observations des Chambres d'Agriculture 41, 37, 45, Fdgdon 37, Fredon Centre, Maingourd, Conserves du blaisois, société Verte Vallée, Baby, Terr'Loire, BCO, Ferme des Arches et Ferme de la Motte. Observateurs : Charles LEGER (SCEE JANVIER), Jérôme BROU, Christian OUSTRIC (Agralys), Laurent CHAUSSET, équipe du CCDL, réseau parcelles des adhérents du Cadran de Sologne, les producteurs de l'ADPLC.

## FRAISIERS

### FRAISIERS JOURS COURTS

#### Contexte d'observations

Parcelles suivies : 3 parcelles en Loir et Cher (secteur Sologne), 1 parcelle dans le Loiret (secteur St Jean le Blanc) + parcelles flottantes des adhérents du Cadran de Sologne.

Comme l'année dernière, les besoins en froid ont été largement satisfaits.

A ce jour, la majorité des tunnels sont posés sur les variétés précoces et de saison. La quasi absence de vent durant le mois de février a grandement facilité cette opération. Le nettoyage des fraisiers est soit réalisé ou en cours. Dans les situations les plus précoces, les boutons devraient sortir ces prochains jours.

#### PUCERONS

Sur quelques parcelles de fraisimotte en jours courts mis en place en hors sol l'été dernier, on trouve des foyers de pucerons. Ces pucerons ont profité d'une climatologie favorable en arrière saison pour se développer.

Sur quelques parcelles en sol, présence parfois importante de pucerons verts ailés ainsi que de jeunes pucerons.

#### Prévision

Sous tunnel, avec la présence d'ensoleillement ces populations vont rapidement se multiplier.

#### ACARIENS

Des formes hivernantes d'acariens sont présentes sur quelques parcelles. Ces acariens se reconnaissent facilement grâce à leur couleur orange clair.

#### Prévision

Les acariens vont bientôt perdre leur forme hivernante. La multiplication dépendra de la température.

#### ALEURODES

Sur certaines parcelles (secteur Fresnes et Soings) présence inhabituelle d'adultes à cette époque de l'année en nombre si important. Des pontes sont repérées sur la face inférieure des feuilles.

Jusqu'à présent la Sologne et l'Orléanais ont été épargnés par ce papillon qui bien que présent n'a pas provoqué de dégâts.

## **BOTRYTIS**

Il s'agit de botrytis de cœur qui s'est développé en arrière saison. Certains cœurs sont d'ores et déjà détruits, d'autres abîmés.

L'aération des tunnels reste un excellent moyen de lutte.

## **FRAISIERS REMONTANTS**

Les plantations sont en cours de réalisation en hors sol et n'ont pas commencé en sol.

Très peu de parcelles sont conservées en deuxième année où l'on rencontre les mêmes problématiques que sur les jours courts.