


## MAÏS

### STADES DU MAÏS

Sur les 45 parcelles renseignées, les stades du maïs se répartissent entre 8 et 18 feuilles pour les stades foliaires. Quatre parcelles sont au stade floraison mâle et cinq au stade floraison femelle. A ce jour, la sortie des panicules et des soies est observée dans de nombreuses parcelles.

### Relevé des stades du maïs au 13/07



### PYRALES


#### Suivi des vols.

On enregistre 362 captures sur la période du 7 au 13 juillet (45 parcelles renseignées).

Détail des captures de pyrales par département :

Département	45	18	28	41	36	37
Nombre de captures	86	48	24	92	79	28
Nombre de parcelles renseignées	9	10	3	10	5	6

## Relevé des captures de pyrale, période du 7 au 13/07



Légère diminution des captures en Beauce, Champagne Berrichonne et Gâtinais mais le nombre de pièges renseignés a également diminué. Augmentation des captures en Touraine, Val de Loire et Sologne cependant le nombre de pièges renseignés est plus important que la semaine dernière. Quelques dégâts sont signalés sur deux parcelles dans le Loiret et le Loir-et-Cher. Une parcelle dans le Cher signale la présence des premières larves dans la panicule.

### Pontes.

Sur les 7 parcelles renseignées, 7 pontes sont signalées 3 dans le Loiret et 4 dans le Loir-et-Cher.

### SESAMIES

Aucune capture sur la période du 7 au 13 juillet.

### PUCERONS

La population de *Rhopalosiphum p.* reste inférieure à 10 par plante sauf pour une parcelle dans l'Indre et Loire où elle va jusqu'à 50 par plante (10 parcelles renseignées).

La population de *Métopolophium d.* (11 parcelles renseignées) reste nulle à inférieure à 10 par plante, exception faite d'une parcelle en Eure-et-Loir indiquant un nombre de pucerons entre 10 et 50 par plante et une dans le Loiret indiquant un nombre entre 50 et 100 par plante.

La population de *Sitobion a.* (11 parcelles renseignées) est de même nulle ou inférieure à 10 par plante. Deux parcelles font exception : une en Eure et Loir avec une population de 10 à 50 pucerons par plante et une dans le Loiret avec 100 à 500 pucerons par plante.

## AUTRES OBSERVATIONS

De nombreux auxiliaires sont observés sur les différentes parcelles du réseau, ce qui contribue à freiner l'augmentation de la population de pucerons.

Des dégâts dus à la tempête du 12 juillet sont signalés (grêle, adossement du maïs, casse de certains pieds, verse).

Une fiche diabrotica est disponible sur le site du SRAL :

[http://draf.centre.agriculture.gouv.fr/article.php3?id\\_article=1200&var\\_mode=calcul](http://draf.centre.agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=1200&var_mode=calcul)

**Prochain message : 20 juillet 2010**

