


MAÏS

STADES DU MAÏS

Sur la période du 28 juillet au 17 août, 23 parcelles ont été observées. Les informations de stade les plus récentes pour chaque parcelle sont mentionnées sur la carte ci-dessous. Dans le détail, il y a 2 parcelles à floraison mâle, 3 à floraison femelle, 10 à floraison+15jours et 8 au stade grain lait-pateux

Relevé des stades les plus récents du maïs



PYRALES

Suivi des vols.

On enregistre un cumul de 207 captures sur la période du 28 juillet au 17 août (27 parcelles renseignées).

Détail des captures de pyrales par département :

Département	45	18	28	41	36	37
Nombre de captures	66	72	24	3	23	9
Nombre de parcelles renseignées	7	10	2	3	2	2


Le suivi des dynamiques de vol par secteurs montre un recul des captures global au cours des deux dernières semaines. La surveillance s'attache désormais à détecter un éventuel début de second vol (voir annexe).

Pontes.

Dans le Loiret, ont été observées 2 pontes (têtes noires) à Villamblain le 29/07 et 2 pontes fraîches à Ferolles le 10/08.

Dans le Cher, 4 pontes ont été observées à Argent-sur-Sauldre le 10/08.

Relevé des captures de pyrale, période du 28/07 au 17/08



SESAMIES

2 sésamies ont été observées dans l'Indre le 10/08. Deux papillons pouvant être des sésamies sont en cours d'identification, un capturé dans le Loir-et-Cher le 29/07 et un capturé dans le Loiret le 9/08

PUCERONS

La population de pucerons (*Sitobion a.*, *Metopolophium d.*, *Ropalosiphum p.*) est nulle pour l'ensemble des parcelles renseignées à l'exception d'une parcelle dans le Loiret qui signalent un nombre de *Ropalosiphum p.* inférieur à 10 par plante.

MALADIE

Helminthosporiose.

Deux parcelles dans le Cher (Sologne) signalent respectivement 10% et 20% de surface nécrosée. L'espèce en cause est à confirmer.

Charbon (*Ustilago maïdis*).

Signalement de charbon à la base des tiges, sur panicule et épi dans le Loiret et le Loir-et-Cher. Sur la parcelle du Loir-et-Cher, 3 à 5% des pieds touchés.

AUTRES OBSERVATIONS

Signalement de dégâts de pyrale (41 et 45)

Signalement de larves (dans les panicules, les tiges, les épis) et de nymphes de pyrale (41 et 45).

Signalement de nombreux auxiliaires présents tels que les coccinelles et les chrysopes (37).

Prochain message : 24 août 2010

Annexe

DYNAMIQUE DE VOL (PYRALE)

