



N°3

du 28/05/2019

Rédacteurs

ARVALIS – Institut du Végétal

Relecteurs

CA37

Observateurs

ARVALIS INSTITUT DU VÉGÉTAL, ASTRIA BASSIN PARISIEN, AXEREA, CA 18, CA 28, CA 36, CA 37, CA 45, CETA CHAMPAGNE BERRICHONNE, FDGEDA DU CHER, LEPLATRE SAS, SCAEL, UCATA, VE OPS.

Directeur de publication :

Philippe NOYAU, Président de la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire

13 avenue des Droits de l'Homme – 45921 ORLEANS

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'écologie avec l'appui financier de l'AFB, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan

MAÏS

SOMMAIRE

Réseau 2019

Stades

1

Pyrale

1

Sésamie

1

Pucerons

3

Limace

3

3

Annexes

5

EN BREF

Une plaine saine.

Premières pyrales capturées

**ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
AUX BSV DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE**

<http://bsv.centre.chambagri.fr/>

Retrouvez des informations sur les adventices en lisant le « [Bulletin d'information Adventices](#) »


Réseau 2019

STADES

CONTEXTE D'OBSERVATIONS

La majorité des parcelles est au stade 4-6 feuilles (81%), les plus en avances (7-10 feuilles) ont été semées fin mars début/avril et les plus en retard fin avril-mi-mai.

La répartition géographique de ces stades est présentée en Annexe ([Stades des parcelles référencées en semaine 22](#)).




PYRALE

[Lien vers la fiche Pyrale](#)


SUIVI DES VOLS

Le suivi de la pyrale par piégeage a débuté sur l'ensemble de la région. **27 pièges ont été relevés** pour une capture totale de **19 pyrales**. Soit **0,7 pyrale/piège** ([relevé des pièges pyrale semaine 22](#)). Ces premières captures, place 2019 dans la moyenne en termes de date de capture et de pyrales capturées. (cf. [graphe 1 ci-dessous](#)).

Un piège dans **le 45 a capturé 13 pyrales** cette semaine. Pour rappel, l'infestation larvaire dans ce département à doubler par rapport aux années précédentes, on peut donc s'attendre à un vol de pyrales assez important cette année. L'autre région ayant enregistré des captures est la champagne Berrichonne, avec une moyenne de **0.7 larve par piège** (cf. [graphe 2 ci-dessous](#)).



Graphique 1 : suivi des vols pluriannuel



Graphique 2 : moyenne de pyrales capturées par piège installé pour un terroir de la région Centre

INDICATIONS CLIMATIQUES

La **somme des températures en base 10** constitue un bon indicateur de la précocité du début des vols de pyrale.

[Les graphiques proposés en Annexe](#) présentent, pour 6 stations de la région Centre (une pour chaque département), les sommes de températures en base 10 depuis le 1^{er} janvier 2019 :

- La courbe rouge représente l'évolution de l'année en cours (2019) intégrant 9 jours de prévisions météorologiques.
- La courbe violette représente les cumuls de l'année précédente (2018).
- Les autres courbes sont les normales trentenaires (médiane, décile 2 et décile 8).

En région Centre-Val de Loire, le début de campagne 2019 est bien plus froid que l'année dernière. Les cumuls de températures en base 10 sont globalement inférieurs à la médiane sur 30 ans depuis le début d'année. Bien que les températures remontent depuis mi-mai, cela ne permet pas de rattraper le retard accumulé depuis le début de l'année. Résultat au 28 mai, le cumul, **au niveau régional**, à un **retard de 7 jours** par rapport à la médiane trentenaire (base 10°C). (C'est-à-dire la médiane, courbe verte). Au niveau départemental, on observe les écarts à la médiane suivants :

- -24 degrés jours à -27° degrés jours en moyenne pour le 18 et le 37,
- -32 degrés jours à -36 degrés jours pour le 41 et le 28,
- -54 degrés jours à -55 degrés jours pour le 36 et le 45.

Les températures sont un facteur influant le développement nymphal des larves de pyrale. Bien qu'elles soient actuellement en dessous des normales de saison, la hausse des températures depuis mi-mai ont permis les 1ers vols de pyrales.

Au vu des orageuses attendues la semaine prochaine, le développement nymphal des larves devrait se poursuivre et de nouveaux vols sont attendus.

SESAMIE

[Lien vers la fiche sésamie](#)

NUISIBILITE : RAPPEL DES OBSERVATIONS 2018.

Les pièges sont de nouveau à installer afin de surveiller l'évolution du papillon dans la région.

Aucune sésamie n'a été capturée pour le moment.

PUCERONS

Metopolophium dirrhodum :

Pas de signalement de l'espèce

Sitobion avenae :


Il a été signalé, dans **3 parcelles du 45**, des pucerons de l'ordre de **1 à 10 pucerons par plante**. Le seuil de risque n'est pas atteint

Rhopalosiphum padi :

Pas de signalement de l'espèce.


Niveau de risque :

De 3 à 8 feuilles




Niveau de risque :

De 3 à 10 feuilles






Niveau de risque :

Levées à 5-6 feuilles



SEUIL DE NUISIBILITE

ESPECE	DESCRIPTION	SEUILS DE NUISIBILITE EN FONCTION DU STADE En nombre de pucerons par plante
<i>Metopolophium dirrhodum</i> 	Taille : environ 2 mm Couleur : vert amande pâle Les cornicules et les pattes ne sont pas colorées. Ligne d'un vert plus foncé sur le dos.	<ul style="list-style-type: none">Avant 3-4 f. du maïs : 5 pucerons/planteEntre 4 et 6 f. du maïs : 10 pucerons/planteEntre 6 et 8 f. du maïs : 20 à 50 pucerons/planteAprès 8-10 f. du maïs : + 100 pucerons/plante Observez la face inférieure des feuilles
<i>Sitobion avenae</i> 	Taille : environ 2 mm Couleur : variable, souvent d'un vert plutôt foncé, parfois brun ou rose jaunâtre. On le distingue de <i>M.dirrhodum</i> essentiellement par la couleur noire de ses cornicules.	Entre 3 et 10 feuilles du maïs : 500 pucerons/plante (avec de nombreux ailés) ou production de miellat sur les feuilles à proximité de l'épi.
<i>Rhopalosiphum padi</i> 	Taille : inférieure à 2 mm Couleur : vert très foncé, presque noir. Forme globuleuse avec une zone rougeâtre foncée caractéristique à l'arrière de l'abdomen.	Arrivée possible dès 5-6 feuilles mais risque majeur de progression à la sortie des panicules. Quand quelques panicules sont touchées par les premiers pucerons, observer tous les jours les parcelles et l'évolution des populations de pucerons et d'auxiliaires.

LIMACE


CONTEXTE D'OBSERVATION

De la levée au stade 6 feuilles, les feuilles sont dévorées et seules les nervures ne sont pas attaquées. Des traces de mucus sont laissées sur la plante ou sur le sol.

ETAT GENERAL


Niveau de risque :

Levée – 5/6 feuilles



Source Photos : ARVALIS
– Institut du végétal

Dégâts de limaces - Semaine 21




Cette semaine, sur 13 parcelles observées, **3 présentent** des traces de dégâts de limaces et **une avec des dégâts plus importants**.

Les informations du modèle limace de l'ACTA nous montre un niveau de risque faible à moyen pour la campagne en cours ([graphique ci-après](#)). La courbe noire représente l'évolution de l'indice de risque pour l'année 2019

Actuellement, les dégâts observés au sein du réseau ne sont toutefois pas supérieurs à ceux signalés les campagnes précédentes.

Station météo de OUZOUEUR-LE-MARCHE (41)



AUTRES OBSERVATIONS


Des dégâts de corbeaux, allant de faibles à moyen, ont été relevés dans le 41 et le 45.

De faibles attaques de petites altises ont été observées dans le 45.

Des dégâts liés à la cicadelle verte ont été relevés dans le 36, le 37 et le 45. La nuisibilité est significative uniquement lorsque la feuille de l'épi commence à porter des traces blanches.

Annexes

Rappel des stades de sensibilité aux principaux ravageurs et maladies




Stades des parcelles référencées en semaine 22




Retour : [Stades](#)

Rappel des infestations Larvaires de pyrales en région Centre à l'automne 2018




Relevé des pièges pyrales en semaine 22









Retour : [Pyrale](#)

Rappel des infestations larvaires de sésamie en région Centre à l'automne 2018



Retour : [sésamie](#).

Sommes de températures (Base 10 depuis le 01/01/2018)



Source des données : Arvalis-Institut du végétal - Météo France

Retour : [Pyrale](#)

Pyrale



Stades de sensibilité

A partir de 10 feuilles et jusqu'à maturité.



Symptômes

De 10-12 feuilles du maïs à la floraison :

- Perforations des feuilles en aspect "coup de fusil",
- Sciure à l'aisselle des feuilles,
- Présence de chenilles,

De la floraison à la maturité :

- Dans les tiges, pédoncules ou dans l'épi, présences de chenilles et sciures.
- Casse des panicules, des tiges au niveau d'une galerie, de pédoncule et chute d'épi.



Identification

Adulte

Le papillon mesure environ 25 mm de large. Les ailes sont larges et fines, le corps est long et mince et les antennes sont cylindriques. Les femelles de couleur jaunâtre clair, ont un abdomen plus court et plus épais que les mâles ; de couleur gris brun, dont les derniers segments de l'abdomen dépassent du bord des ailes repliées.

Larve

La chenille mesure de 2-3 mm à 20 mm selon le stade larvaire. De couleur gris clair, elles présentent sur le dos une ligne longitudinale gris foncé et des ponctuations noires réparties sur chaque segment, de part et d'autres de la ligne médiane.



Conditions favorables

Monoculture de maïs avec forte pression du parasite, fortes températures durant la nymphose, hivers sec et absence de températures négatives du sol.



Leviers agronomiques

Après la récolte : le broyage fin des cannes de maïs, que l'on soit en monoculture de maïs ou en maïs assolé, va diminuer la population de larves de pyrale présentes à l'automne de l'ordre de 70 à 80%. Les pluies et températures douces entraînent le développement de pathogènes sur les larves diapausantes. Les mesures prophylactiques réalisées à l'échelle du bassin de parcelles sont plus efficaces qu'une lutte individuelle.



Méthode d'observation

Adulte : suivi des vols par un comptage des papillons piégés.


Utiliser le piège « delta » avec une plaque engluée, puis compter les individus ainsi capturés.

Larve : comptage de l'infestation larvaire avant récolte

Avant la récolte : disséquer 30 cannes et compter le nombre de larve et chrysalide de l'espèce- puis faire le rapport individus/plantes.

Retour : [Pyrale](#)





Sésamie



Stades de sensibilité

1^{ère} génération : à partir de 3-4 feuilles jusqu'à 10 feuilles.

2^{nde} génération : à partir de la floraison jusqu'à maturité.



Symptômes

1^{ère} génération :

- Dessèchement et disparition de plusieurs plantes successives,
- Présence des larves au collet des plantes,
- Présence d'une grosse perforation à la base de la tige sur les maïs les plus développés.

2^{nde} génération :

- Sur tige, pédoncule et épi : présence de galeries et de sciures,
- Une plus forte proportion de larves demeure en bas de tige.



Identification

Adulte

Le papillon mesure 30 à 40 mm d'envergure. Les ailes antérieures sont brunes, les ailes postérieures blanches. Le thorax et la tête sont velus. L'abdomen est massif.

Larve

La chenille a une longueur de 40 mm jusqu'au dernier stade larvaire. Elles sont de couleur rose pâle, sont dépourvues de poils et ont un point noir de chaque côté des segments.



Conditions favorables

Monoculture de maïs avec forte pression du parasite, fortes températures durant la nymphose, hivers sec et absence de températures négatives du sol.



Leviers agronomiques

Après la récolte : le broyage fin des cannes de maïs, que l'on soit en monoculture de maïs ou en maïs assolé, va diminuer la population de larves de sésamies présentes à l'automne de l'ordre de 70 à 80%. Les larves de sésamies sont très sensibles au froid, les températures négatives au sol tuent les larves. Les pluies et températures douces entraînent de façon significative des développements de pathogènes sur les larves diapausantes. Les mesures prophylactiques réalisées à l'échelle du bassin de parcelles sont plus efficaces qu'une lutte individuelle. Dans la mesure du possible, la lutte doit être collective.



Méthode d'observation


Adulte : suivi des vols par un comptage des papillons piégés.

Utiliser le piège « pot à entonnoir », puis compter les individus ainsi capturés.


Larve : comptage de l'infestation larvaire avant récolte

Avant la récolte : disséquer 30 cannes et compter le nombre de larve et chrysalide de l'espèce puis faire le rapport individus/plantes.

Retour : [sésamie](#).



Héliothis



Stades de sensibilité

A partir de la floraison jusqu'à début grain laiteux.



Symptômes

- Attaque au sommet de l'épi,
- Les soies sont dévorées,
- Trace d'un passage large dû aux larves au sommet de l'épi.
- Les larves peuvent être observées sur feuilles si les panicules et épis ne peuvent être colonisés.

Il est très fréquent de ne pas voir l'attaque d'héliothis car, lors de la récolte, les larves ne sont plus sur épis, elles se réfugient dans le sol pour poursuivre leur cycle.



Identification

Adulte

Le papillon a une envergure de 35 à 40 mm. Les ailes antérieures présentent des ponctuations noires et les ailes postérieures sont bordées d'une bande noire. Le thorax et la tête sont velus. L'abdomen est massif et les yeux sont verts.

Larve

Les chenilles mesurent 30 à 35 mm au dernier stade larvaire. Elles sont de couleur très variable : le plus souvent vertes, mais elles peuvent être jaunâtre, verdâtre, brune. Elles présentent des lignes longitudinales latérales et ses segments sont ciliés.



Conditions favorables

La conjonction entre la période de vol des papillons, l'émission des jeunes organes fructifères par une culture et de fortes températures, est le principal facteur de risque d'attaque par l'héliothis.



Méthode d'observation

Adulte : suivi des vols par un comptage des papillons piégés.

Utiliser le piège « pot à entonnoir », puis compter les individus ainsi capturés.

Larve : comptage de l'infestation larvaire avant récolte

Avant la récolte : disséquer 30 cannes et compter le nombre de larve et chrysalide de l'espèce puis faire le rapport individus/plantes.





Stades de sensibilité

A partir du semis jusqu'à 6-7 feuilles.



Symptômes

- Attaques sur graines ou coléoptiles : disparition de la semence ou de la plantule.
- Attaques sur jeunes plantules : feuille centrale flétrie, blocage, dessèchement puis disparition de la plantule.
- Attaques au collet de plantes plus âgées : plantes raccourcies avec des feuilles anormalement larges, plantes présentant un cornet foliaire cylindrique allongé avec peu de feuilles dégagées, présence de stries blanches longitudinales sur les feuilles, développement de bourgeons axillaires qui deviendront des talles.
- La présence de larves confirme le diagnostic.



Identification

Adulte

Coléoptère de couleur brun-noirâtre. Sa taille varie de 8 à 12 mm. Il pond dans la couche superficielle du sol.

La larve

De couleur jaune paille a une taille variant entre 20 et 25 mm au dernier stade larvaire. Ses téguments sont durs, elle présente trois paires de pattes.



Conditions favorables

Présents sur tout le territoire, les taupins affectionnent les régions humides, ainsi que les zones où la présence de prairie est significative. Il est plus souvent inféodé aux sols riches en matière organique et dans les assolements intégrant de la prairie permanente ou artificielle. Des dégâts antérieurs sur la parcelle, un climat froid et humide ralentissant la levée puis la croissance et le développement des plantes, sont des contextes propices à une attaque de taupins sur jeunes maïs.



Leviers agronomiques

La fertilisation starter favorise le développement racinaire et peut permettre une esquivance partielle des faibles attaques de taupins. Cette stratégie est très vite limitée en cas d'attaque moyenne à forte. Un semis pas trop précoce va favoriser une levée et une croissance rapide du maïs (température suffisante, pas de risque de gel) et donc limiter les dégâts de taupin.




Méthode d'observation

Méthode de notation globale des dégâts : 5 Classes.




Chrysomèle

Nuisibilité



Fréquence



Stades de sensibilité

A partir du semis jusqu'à 6-7 feuilles.



Symptômes

Larves

- Attaques par foyers ou tâches dans les parcelles,
- Racines coronaires dévorées,
- Verse végétative typique, avec symptôme en col-de-cygne,
- Epis lacuneux qui sont souvent la conséquence d'un stress hydrique provoqué par l'absence de racine.

Adultes

Avant le stade floraison, trou sur la cuticule des feuilles et soies rongées.



Identification

Adulte

Petit coléoptère de 5 à 7 mm de long (femelle, mâle) dont les élytres sont plutôt unicolores ; d'un noir intense pour le mâle et présentent une alternance de bandes noires et jaunes pour la femelle.

Larve

Les larves sont molles, de couleur blanc crémeux et ont un corps cylindrique. Elles présentent à l'avant une capsule céphalique de couleur marron et à l'arrière une plaque marron foncé.



Conditions favorables

Les plus fortes nuisibilités ont lieu lorsque les populations de chrysomèle du maïs sont abondantes après plusieurs années successives de culture de maïs.



Leviers agronomiques

La rotation des cultures. L'absence de maïs, même une seule année, limite très fortement la population de chrysomèle du maïs présente dans la parcelle.



Méthode d'observation

Installer un piège à phéromones (PAL) par parcelle, à l'intérieur de la parcelle. Effectuer un relevé hebdomadaire (si possible toujours le même jour) et compter tous les adultes de chrysomèle du maïs englués sur le piège.

En cas de capture d'adulte de chrysomèle du maïs ou de suspicion dans une région où le ravageur n'avait pas été encore détecté, prélever l'insecte (dans un tube contenant de l'alcool à 70°) et l'envoyer à l'animateur filière pour vérification.

