



**N°12**

du 30/07/2019

**Rédacteurs**

ARVALIS – Institut du Végétal

**Relecteurs**

CA45

**Observateurs**

ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL, ASTRIA BASSIN PARISIEN, AXEREAL, CA 18, CA 28, CA 36, CA 41, CA 45, CETA CHAMPAGNE BERRICHONNE, EARL BENOIT GAUJARD, EARL GENI, FDGEDA DU CHER, FREDON CENTRE, SOUFFLET ATLANTIQUE, UCATA, VE OPS.

**Directeur de publication :**

**Philippe NOYAU**, Président de la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire

**13 avenue des Droits de l'Homme – 45921 ORLEANS**

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

*Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'écologie avec l'appui financier de l'AFB, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan*

# MAÏS

## SOMMAIRE

<b>Réseau 2019</b>	<b>1</b>
Stades	1
Pyrale	1
Sésamie	2
Cicadelle	2
Chrysomèle	2
Pucerons	3
Autres observations	3
<b>Annexes</b>	<b>4</b>

## EN BREF

Des parcelles au stade grain laiteux au sud de la Loire.

Un vol de pyrale historiquement bas et une activité des ravageurs faibles.

**ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT**  
AUX BSV DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE  
<http://bsv.centre.chambagri.fr/>

Retrouvez des informations sur les adventices en lisant le « [Bulletin d'information Adventices](#) »

# Réseau 2019


Pour la période du 25 juillet au 30 juillet (semaine 31), **47 parcelles de maïs** ont été observées dans le cadre du réseau BSV Région Centre – Val de Loire.

## STADES

[Rappel des stades de sensibilités](#)

### CONTEXTE D'OBSERVATIONS

Les parcelles observées cette semaine ont majoritairement atteint ou dépassé de 15 jours le stade floraison femelle. Les plus en avances, situées au sud de la Loire, dans les départements de l'Indre et de l'Indre et Loire, sont déjà au stade grain laiteux. La répartition géographique de ces stades est présentée en annexe ([Stades des parcelles référencées, semaine 31](#))




## PYRALE

[Lien vers la fiche Pyrale](#)

### SUIVI DES VOLS


Cette semaine **42 pièges ont été relevés**, pour un nombre de captures totales de **39 pyrales, soit 0.9 pyrale/piège (relevé des pièges pyrale semaine 31)**. Le nombre de pyrales capturées est historiquement bas pour la période. De plus, depuis le pic de vol constaté en semaine 25, aucune hausse des captures n'a été enregistrée à l'échelle de la région. Historiquement, les semaines où un second pic de vol aurait pu être constaté sont également dépassées. Cependant au vu du caractère spécifique de l'année et de la présence avérée sur certains secteurs de cycle bivoltin, les captures doivent être maintenues en prévention d'un éventuel second pic de vol. (cf. [graphe 1 ci-dessous](#)).



Graphique 1 : suivi des vols pluriannuels

La dynamique de vol est également très basse sur l'ensemble des secteurs (cf-graphe 2 ci-dessous) :

- **Pour la Beauce + Perche** : 1.1 pyrales/piège cette semaine. Les captures les plus élevées ont été enregistrées près de la commune de **Neuvy-en-Dunois (28)** avec 8 papillons.
- **Champagne-Berrichonne** : 1.2 pyrales/piège cette semaine. Le piège proche de la commune de **Brécly** dans le 18, a enregistré une capture de 4 pyrales.
- **Pour le Gâtinais** : seules 2 pyrales ont été capturées près de la commune de **Corbeilles (45)**.
- **Sologne + Val de Loire** : 2 communes sur les 8 observées ont enregistré des captures de pyrales, soit 2 et 3 pyrales respectivement près des communes d'**Ouzouer-sur-Trezée** et de **Vennecy (45)**.
- **Touraine** : 2 communes sur les 4 observées ont enregistré des captures de pyrales, soit 1 et 3 pyrales respectivement près des communes de **Sainte-Maure-de-Touraine** et de **Dolus-le-Sec (37)**.



Graphique 2 : moyenne de pyrales capturées par piège installé pour un terroir de la région Centre

## SESAMIE

[Lien vers la fiche sésamie](#)

Cette semaine sur les 10 pièges observés, seul le piège situé près de Niherne (Indre) a capturé 6 sésamies.



## CICADELLE

La présence de cicadelles a été relevée dans l'ensemble de la région. La nuisibilité est significative uniquement lorsque la feuille de l'épi commence à porter des traces blanches. Pour rappel, la feuille de l'épi est en moyenne 5 à 6 feuilles en dessous de la panicule. Des parcelles situées dans le 18, 37 et 45, en cours de floraison femelle ou l'ayant dépassé depuis 15 jours, présentent des traces de cicadelles sur des feuilles allant de la F8 à la F13.



## CHRYSOMELE

[Lien vers la fiche chrysomèle](#)

La chrysomèle des racines du maïs (*Diabrotica virgifera virgifera*) est un insecte invasif originaire d'Amérique introduit en Europe Centrale au cours des années 90 et qui a depuis étendu son aire de répartition géographique vers l'Italie et les régions Rhône-Alpes et Alsace où il est désormais considéré comme étant durablement implanté. Ailleurs en France, sa détection est plus sporadique mais en 2017, un foyer a été signalé en Poitou-Charentes, ce qui suggère que l'insecte continue sa progression.



Crédits photo : Arvalis - Institut du végétal

Ce coléoptère n'est plus un organisme de quarantaine depuis 2014, les parcelles sur lesquelles il est détecté ne sont donc plus soumises à des mesures de lutte, de surveillance, d'éradication ou de confinement obligatoires.

Ce sont les larves qui provoquent les dégâts les plus dommageables : attaques par foyers ou taches dans les parcelles, racines coronaires dévorées, verse végétative typique avec symptôme en col-de-cygne, épis lacuneux qui sont souvent un signe de stress hydrique provoqué par l'absence de racine. Les adultes peuvent aussi provoquer des dommages : avant le stade floraison, les adultes se nourrissent de la cuticule des feuilles. Ensuite, ils se nourrissent des soies, de pollen, voire des grains au sommet de l'épi. On peut observer des bandes plus ou moins larges et décolorées sur les limbes des feuilles, des soies coupées, des grains creusés.

### CONTEXTE D'OBSERVATION

**Dans le BSV de la semaine dernière il avait été rapporté une hypothétique chrysomèle. Finalement, il ne s'agissait pas de cet insecte. Cette semaine, sur 28 pièges relevés, aucune chrysomèle n'a été capturée..**


## PUCERONS

### *Rhopalosiphum padi* :

L'espèce a été signalée dans le 28, près d'Allaines-Mervilliers. **10% des panicules de la parcelle sont touchées.** Le seuil de nuisibilité est atteint et la parcelle doit faire l'objet d'observations régulières pour suivre l'évolution des populations

Niveau de risque :  
Levées à floraison mâle

### SEUIL DE NUISIBILITE


 <p><i>Rhopalosiphum padi</i></p>	<p>Taille : inférieure à 2 mm Couleur : vert très foncé, presque noir. Forme globuleuse avec une <b>zone rougeâtre</b> foncée caractéristique à l'arrière de l'abdomen.</p>	<p>Arrivée possible dès 5-6 feuilles mais risque majeur de progression à la sortie des panicules. Quand quelques panicules sont touchées par les premiers pucerons, observer tous les jours les parcelles et l'évolution des populations de pucerons et d'auxiliaires.</p>
--	---	--

## AUTRES OBSERVATIONS

Des traces de dégâts de la petite altise ont été observées dans le Loiret, près des communes de Chaingy et Sandillon. Egalement des dégâts liés à la pyrale (limbe coup de fusil) ont été relevés sur 10% des plantes dans la parcelle près de Chaingy

# Annexes

## Rappel des stades de sensibilité aux principaux ravageurs et maladies




## Stades des parcelles référencées en semaine 31



- = Flm
- = Flf
- = Fl15
- = Grlp

Retour : [Stades](#)

Relevé des pièges pyrales en semaine 31



Retour : [Pyrale](#)

# Pyrale



## Stades de sensibilité

A partir de 10 feuilles et jusqu'à maturité.



## Symptômes

De 10-12 feuilles du maïs à la floraison :

- Perforations des feuilles en aspect "coup de fusil",
- Sciure à l'aisselle des feuilles,
- Présence de chenilles,

De la floraison à la maturité :

- Dans les tiges, pédoncules ou dans l'épi, présences de chenilles et sciures.
- Casse des panicules, des tiges au niveau d'une galerie, de pédoncule et chute d'épi.



## Identification

### Adulte

Le papillon mesure environ 25 mm de large. Les ailes sont larges et fines, le corps est long et mince et les antennes sont cylindriques. Les femelles de couleur jaunâtre clair, ont un abdomen plus court et plus épais que les mâles ; de couleur gris brun, dont les derniers segments de l'abdomen dépassent du bord des ailes repliées.

### Larve

La chenille mesure de 2-3 mm à 20 mm selon le stade larvaire. De couleur gris clair, elles présentent sur le dos une ligne longitudinale gris foncé et des ponctuations noires réparties sur chaque segment, de part et d'autres de la ligne médiane.



## Conditions favorables

Monoculture de maïs avec forte pression du parasite, fortes températures durant la nymphose, hivers sec et absence de températures négatives du sol.



## Leviers agronomiques

Après la récolte : le broyage fin des cannes de maïs, que l'on soit en monoculture de maïs ou en maïs assolé, va diminuer la population de larves de pyrale présentes à l'automne de l'ordre de 70 à 80%. Les pluies et températures douces entraînent le développement de pathogènes sur les larves diapausantes. Les mesures prophylactiques réalisées à l'échelle du bassin de parcelles sont plus efficaces qu'une lutte individuelle.



## Méthode d'observation

### Adulte : suivi des vols par un comptage des papillons piégés.

Utiliser le piège « delta » avec une plaque engluée, puis compter les individus ainsi capturés.

### Larve : comptage de l'infestation larvaire avant récolte

Avant la récolte : disséquer 30 cannes et compter le nombre de larve et chrysalide de l'espèce- puis faire le rapport individus/plantes.

Retour : [Pyrale](#)



# Sésamie



## Stades de sensibilité

**1<sup>ère</sup> génération** : à partir de 3-4 feuilles jusqu'à 10 feuilles.

**2<sup>nde</sup> génération** : à partir de la floraison jusqu'à maturité.



## Symptômes

**1<sup>ère</sup> génération** :

- Dessèchement et disparition de plusieurs plantes successives,
- Présence des larves au collet des plantes,
- Présence d'une grosse perforation à la base de la tige sur les maïs les plus développés.

**2<sup>nde</sup> génération** :

- Sur tige, pédoncule et épi : présence de galeries et de sciures,
- Une plus forte proportion de larves demeure en bas de tige.



## Identification

### Adulte

Le papillon mesure 30 à 40 mm d'envergure. Les ailes antérieures sont brunes, les ailes postérieures blanches. Le thorax et la tête sont velus. L'abdomen est massif.

### Larve

La chenille a une longueur de 40 mm jusqu'au dernier stade larvaire. Elles sont de couleur rose pâle, sont dépourvues de poils et ont un point noir de chaque côté des segments.



## Conditions favorables

Monoculture de maïs avec forte pression du parasite, fortes températures durant la nymphose, hivers sec et absence de températures négatives du sol.



## Leviers agronomiques

**Après la récolte** : le broyage fin des cannes de maïs, que l'on soit en monoculture de maïs ou en maïs assolé, va diminuer la population de larves de sésamies présentes à l'automne de l'ordre de 70 à 80%. Les larves de sésamies sont très sensibles au froid, les températures négatives au sol tuent les larves. Les pluies et températures douces entraînent de façon significative des développements de pathogènes sur les larves diapausantes.

Les mesures prophylactiques réalisées à l'échelle du bassin de parcelles sont plus efficaces qu'une lutte individuelle. Dans la mesure du possible, la lutte doit être collective.



## Méthode d'observation

**Adulte : suivi des vols par un comptage des papillons piégés.**

Utiliser le piège « pot à entonnoir », puis compter les individus ainsi capturés.

**Larve : comptage de l'infestation larvaire avant récolte**


Avant la récolte : disséquer 30 cannes et compter le nombre de larve et chrysalide de l'espèce puis faire le rapport individus/plantes.

**Retour** : [sésamie](#)





# Héliothis



## Stades de sensibilité

A partir de la floraison jusqu'à début grain laiteux.



## Symptômes

- Attaque au sommet de l'épi,
- Les soies sont dévorées,
- Trace d'un passage large dû aux larves au sommet de l'épi.
- Les larves peuvent être observées sur feuilles si les panicules et épis ne peuvent être colonisés.

Il est très fréquent de ne pas voir l'attaque d'héliothis car, lors de la récolte, les larves ne sont plus sur épis, elles se réfugient dans le sol pour poursuivre leur cycle.



## Identification

### Adulte

Le papillon a une envergure de 35 à 40 mm. Les ailes antérieures présentent des ponctuations noires et les ailes postérieures sont bordées d'une bande noire. Le thorax et la tête sont velus. L'abdomen est massif et les yeux sont verts.

### Larve

Les chenilles mesurent 30 à 35 mm au dernier stade larvaire. Elles sont de couleur très variable : le plus souvent vertes, mais elles peuvent être jaunâtre, verdâtre, brune. Elles présentent des lignes longitudinales latérales et ses segments sont ciliés.



## Conditions favorables

La conjonction entre la période de vol des papillons, l'émission des jeunes organes fructifères par une culture et de fortes températures, est le principal facteur de risque d'attaque par l'héliothis.



## Méthode d'observation

### Adulte : suivi des vols par un comptage des papillons piégés.

Utiliser le piège « pot à entonnoir », puis compter les individus ainsi capturés.

### Larve : comptage de l'infestation larvaire avant récolte

Avant la récolte : disséquer 30 cannes et compter le nombre de larve et chrysalide de l'espèce puis faire le rapport individus/plantes.





### Stades de sensibilité

A partir du semis jusqu'à 6-7 feuilles.



### Symptômes

- Attaques sur graines ou coléoptiles : disparition de la semence ou de la plantule.
- Attaques sur jeunes plantules : feuille centrale flétrie, blocage, dessèchement puis disparition de la plantule.
- Attaques au collet de plantes plus âgées : plantes raccourcies avec des feuilles anormalement larges, plantes présentant un cornet foliaire cylindrique allongé avec peu de feuilles dégagées, présence de stries blanches longitudinales sur les feuilles, développement de bourgeons axillaires qui deviendront des talles.
- La présence de larves confirme le diagnostic.



### Identification

#### Adulte

Coléoptère de couleur brun-noirâtre. Sa taille varie de 8 à 12 mm. Il pond dans la couche superficielle du sol.

#### La larve

De couleur jaune paille a une taille variant entre 20 et 25 mm au dernier stade larvaire. Ses téguments sont durs, elle présente trois paires de pattes.



### Conditions favorables

Présents sur tout le territoire, les taupins affectionnent les régions humides, ainsi que les zones où la présence de prairie est significative. Il est plus souvent inféodé aux sols riches en matière organique et dans les assolements intégrant de la prairie permanente ou artificielle. Des dégâts antérieurs sur la parcelle, un climat froid et humide ralentissant la levée puis la croissance et le développement des plantes, sont des contextes propices à une attaque de taupins sur jeunes maïs.



### Leviers agronomiques

La fertilisation starter favorise le développement racinaire et peut permettre une esquivance partielle des faibles attaques de taupins. Cette stratégie est très vite limitée en cas d'attaque moyenne à forte. Un semis pas trop précoce va favoriser une levée et une croissance rapide du maïs (température suffisante, pas de risque de gel) et donc limiter les dégâts de taupin.




### Méthode d'observation

Méthode de notation globale des dégâts : 5 Classes.




# Chrysomèle

Nuisibilité



Fréquence



## Stades de sensibilité

A partir du semis jusqu'à 6-7 feuilles.



## Symptômes

### Larves

- Attaques par foyers ou tâches dans les parcelles,
- Racines coronaires dévorées,
- Verse végétative typique, avec symptôme en col-de-cygne,
- Epis lacuneux qui sont souvent la conséquence d'un stress hydrique provoqué par l'absence de racine.

### Adultes

Avant le stade floraison, trou sur la cuticule des feuilles et soies rongées.



## Identification

### Adulte

Petit coléoptère de 5 à 7 mm de long (femelle, mâle) dont les élytres sont plutôt unicolores ; d'un noir intense pour le mâle et présentent une alternance de bandes noires et jaunes pour la femelle.

### Larve

Les larves sont molles, de couleur blanc crémeux et ont un corps cylindrique. Elles présentent à l'avant une capsule céphalique de couleur marron et à l'arrière une plaque marron foncé.



## Conditions favorables

Les plus fortes nuisibilités ont lieu lorsque les populations de chrysomèle du maïs sont abondantes après plusieurs années successives de culture de maïs.



## Leviers agronomiques

La rotation des cultures. L'absence de maïs, même une seule année, limite très fortement la population de chrysomèle du maïs présente dans la parcelle.



## Méthode d'observation

Installer un piège à phéromones (PAL) par parcelle, à l'intérieur de la parcelle. Effectuer un relevé hebdomadaire (si possible toujours le même jour) et compter tous les adultes de chrysomèle du maïs englués sur le piège.

En cas de capture d'adulte de chrysomèle du maïs ou de suspicion dans une région où le ravageur n'avait pas été encore détecté, prélever l'insecte (dans un tube contenant de l'alcool à 70°) et l'envoyer à l'animateur filière pour vérification.

Retour : [chrysomèles](#)

