

## TOURNESOL

### RESEAU 2011

Le réseau Tournesol Centre est actuellement composé de 28 parcelles. Les dernières observations ont été réalisées sur 16 parcelles.

### STADE DES TOURNESOLS

Près de 50 % des parcelles ont atteint ou dépassé le stade E1.

Stade	% de parcelle
B3-B4	0%
B5	0%
B6	13%
B7	19%
B8	6%
B9	6%
B10	6%
B11-12	6%
B13-14	0%
E1	31%
E2	13%
E3	0%


### PUCERON VERT DU PRUNIER

#### Contexte d'observations

Les pucerons sont toujours signalés dans plus de 80 % des parcelles observées.

La présence de coccinelles est toujours signalée (adultes et larves).

Près de 50 % des parcelles du réseau ont dépassé le stade de sensibilité.



### Période de risque

De la levée à la formation du bouton floral (E1).

### Seuil de nuisibilité

Plus de 10 % des plantes avec des symptômes marqués de crispation.

La crispation des feuilles entraîne à la fois une moindre activité photosynthétique et une augmentation du risque sclérotinia du bouton (rétention d'humidité favorable à la germination des spores).

## PHOMOPSIS

### Contexte d'observations

La simulation de la maturation du champignon n'a quasiment pas évolué. Le maintien des conditions sèches n'est pas favorable à la maladie.

