

COLZA

RESEAU 2012 - 2013

Malgré les conditions de levées difficiles, la déclaration des parcelles du réseau BSV Centre dans la base Vigicultures se poursuit. Il y a actuellement 61 parcelles déclarées.

29 parcelles ont fait l'objet d'au moins une observation ces derniers jours dont 2 pour le suivi de la maturation phoma.

STADE DES COLZAS

Selon les conditions d'humidité du sol lors des opérations de semis, la grande majorité des parcelles de la région Centre ne sont pas encore levées représentées par 9 parcelles au stade « semis » mais aussi par les parcelles déclarées et non renseignées à ce jour dans la base Vigicultures.

Il y a cependant des parcelles en cours de levées et mêmes des parcelles qui atteignent le stade B3 (Cher ou Eure-et-Loir).

ALTISE DES CRUCIFERES

Contexte d'observations

Une seule parcelle du réseau signale pour l'instant la présence de petites altises dans la cuvette. Par contre 2 parcelles du réseau sont déjà concernées par des dégâts de morsures sur feuilles ne dépassant pas pour l'instant 10 % des plantes.

La vigilance doit être renforcée près des bordures notamment dans le cas des opérations de travail du sol qui pourraient être mises en œuvre sur les anciennes parcelles de colza pouvant occasionner un déplacement des insectes vers de nouvelles sources alimentaires.

Période de risque

→ depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles.

Seuil de nuisibilité

→ 8 pieds sur 10 portants des morsures, sans dépasser le ¼ de la surface végétative détruite.

Au-delà du nombre de plante avec dégâts, il est important de déterminer la surface végétative endommagée.

ALTISE D'HIVER

Contexte d'observations

Les relevés de cuvettes indiquent la présence d'altise d'hiver dans 5 pièges du réseau sur 20 observées. Pour l'instant le nombre maximum ne dépasse pas 4 individus.

Si habituellement, le risque adulte est écarté dans notre région par le développement des colzas lors de l'apparition des grosses altises (colza > 3-4 feuilles), ce n'est pas le cas cette année. Il faudra donc être vigilant sur les dégâts alimentaires occasionnés sur les feuilles par les adultes.

Période de risque

→ depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles dans le cadre du risque adulte.

Seuil de nuisibilité

→ 8 pieds sur 10 portants des morsures.

TENTHREDE DE LA RAVE

Contexte d'observations

Pas de signalement pour l'instant de larves de tenthrèdes sur les plantes, par contre 8 cuvettes sur 13 signalent la présence d'adultes.

Il n'y a pas forcément de lien direct entre captures dans les pièges et présence sur les plantes mais là encore dans la situation actuelle de croissance des colzas, la vigilance est de mise.

Période de risque

→ depuis la levée jusqu'au stade 6 feuilles mais généralement plutôt entre 3 et 6 feuilles en cas de population larvaire importante.

Seuil de nuisibilité

→ présence de larves avec des dégâts sur feuilles supérieurs au ¼ de la surface végétative.