

COLZA

RESEAU 2013 - 2014

Le réseau BSV Colza Centre s'étoffe avec l'ajout de 20 parcelles supplémentaires par rapport à la semaine dernière. Le nombre de parcelles déclarées est actuellement de 68 parcelles dont 66 pour un suivi régulier et 2 pour le suivi de maturation des périthèces de phoma suivi par la FREDON Centre et la FDGDON37.

STADE DES COLZAS

Les conditions de levée sont très variables d'une zone à l'autre sur l'ensemble de la région. Si certains semis ont pu bénéficier d'une humidité du sol suffisante pour permettre la levée (humidité du sol et/ou pluie après le semis) pour d'autres l'absence de pluie ne permet pas pour l'instant la levée.

Dans le cadre du réseau du BSV, plus de 60 % des parcelles sont levées ou en cours de levée mais avec pour certaines une hétérogénéité de peuplement.

Stade ou Période	% de parcelles
Semis	27%
Levée en cours	31%
A	27%
B1	2%
B2	11%
B3	2%

ALTISE DES CRUCIFERES

Contexte d'observations

Les premières captures de petites altises sont signalées dans 5 parcelles du réseau (Indre, Loiret, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher) surtout à proximité d'anciennes parcelles de colza.

Les dégâts sur feuilles sont signalés dans le Loiret, l'Indre et le Cher mais pour l'instant faible, le pourcentage de surface foliaire endommagée ne dépasse pas 5 %.

La vigilance est de mise en bordure des anciennes parcelles de colza, surtout si des opérations de travail du sol sont en cours pour détruire les repousses de la campagne 2013 ceci aurait pour conséquence le déplacement des insectes vers les parcelles en cours de levée.

Période de risque

→ depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles.

Seuil de nuisibilité

→ 8 pieds sur 10 portants des morsures, sans dépasser le ¼ de la surface végétative.

Au-delà du nombre de plantes avec dégâts, il est important de déterminer la surface végétative endommagée.

TENTHREDE DE LA RAVE

Contexte d'observations

Pour l'instant aucune larve de tenthrède (cf. photos en annexe) n'est signalée dans les parcelles du réseau. Par contre 8 parcelles (Cher et Loiret) sur 22 signalent la présence d'adulte dans les cuvettes. L'adulte n'est pas nuisible pour la culture du colza.

Le piégeage actuel d'adultes n'indique pas forcément la présence de larves sur les plantes ultérieurement.

Période de risque

→ depuis la levée jusqu'au stade 6 feuilles mais généralement plutôt entre 3 et 6 feuilles en cas de population larvaire importante.

Seuil de nuisibilité

→ présence de larves avec des dégâts sur feuilles supérieurs au ¼ de la surface végétative.

LIMACES

Des dégâts de limaces sont signalés dans 4 parcelles sur 23 observées (Indre-et-Loire, Indre, Loiret et Cher)

ALTISE D'HIVER

Contexte d'observations

Les premières grosses altises ont été capturées au cours des derniers jours dans l'Eure-et-Loir et le nord du Cher.

Le nombre d'individus capturés ne dépasse pas deux par cuvette.

Période de risque

→ depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles dans le cadre du risque adulte.

Seuil de nuisibilité


→ 8 pieds sur 10 portants des morsures sans dépasser le ¼ de la surface végétative.

Au-delà du nombre de plantes avec dégâts, il est important de déterminer la surface végétative endommagée.

Annexes

Tenthrède de la rave

ADULTES



LARVES

