



N°19c

du 17/02 au
23/02/2021

Rédacteurs

TERRES INOVIA en
collaboration avec la
Chambre d'Agriculture de
l'Indre

Observateurs

AGRIAL, ASTRIA BASSIN
PARISIEN, AXEREAL, CA 18, CA
28, CA 36, CA 37, CA 41, CA
45, CAPROGA, CETA
CHAMPAGNE BERRICHONNE,
FDGEDA DU CHER, LALLIER
SEBASTIEN, SOUFFLET
AGRICULTURE, UCATA.

Relecteurs

La Chambre d'Agriculture de
l'Indre-et-Loire, SRAL Centre.

Directeur de publication :

Philippe NOYAU,
Président de la Chambre
régionale d'agriculture du
Centre-Val de Loire

**13 avenue des Droits de
l'Homme – 45921 ORLEANS**

Ce bulletin est produit à
partir d'observations
ponctuelles. Il donne une
tendance de la situation
sanitaire régionale, qui ne
peut pas être transposée
telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale
d'agriculture du Centre-Val
de Loire dégage donc toute
responsabilité quant aux
décisions prises par les
agriculteurs pour la
protection de leurs cultures.

*Action du plan Ecophyto
pilote par les ministères en
charge de l'agriculture, de
l'écologie, de la santé et de
la recherche, avec l'appui
technique et financier de
l'Office français de la
Biodiversité*

Colza

Ce BSV complémentaire à celui de mardi a pour objectif de faire le point sur les résultats de maturations sexuelles de femelles de charançons de la tige.

CHARANÇON DE LA TIGE DU COLZA

- 22 échantillons de charançons de la tige ont été récupérés dans les cuvettes entre le 21 et le 25 février 2021.
- 17 contenaient des femelles qui ont pu être disséquées par les laboratoires de la FREDON de la région Centre Val de Loire.
- L'analyse du graphique ci-dessous doit se faire **en prenant bien en compte le nombre de femelles analysées**.
- Comme prévu dans le bulletin de mardi, les conditions climatiques plutôt chaudes sont favorables à l'évolution de la maturation. Mais l'acquisition de la capacité à pondre des premières femelles n'est observée que dans 3 sites pour l'instant au sud Loire.
Malgré le rafraîchissement du Week End, les conditions de vols devraient rester favorables dans les prochains jours. Avec les températures de hier, la capacité à pondre devrait aussi évoluer rapidement, notamment pour tous les sites avec des œufs de tailles définitives (couleur jaune sur le graphique).
- On peut considérer comme prévu que le risque va passer de **moyen** à **fort** pour le sud de la région dans les prochains jours. Pour l'instant, pour le nord Loire, le risque peut être classé de **moyen**.

