

## Viticulture

Pour la 2<sup>ème</sup> campagne, le BSV Viticulture Centre reprend son activité et sur les mêmes bases que l'an dernier. Le réseau est constitué de 60 parcelles de St Nicolas de Bourgueil à Sancerre avec plus de 32 observateurs. L'ensemble des organismes techniques de la filière viticole participe aux observations et à l'élaboration de ce bulletin.

L'organisation de la campagne 2011 est la suivante :

- Animateur filière : Michel BADIER - CA41
  
- Correspondants départementaux :
  - Anne Cécile KASPRYK - CA37
  - François DAL - Sicavac
  
- Cellule d'analyse de risque composé de 6 membres :  
Michel BADIER - CA41, Anne Cécile KASPRYK - CA37, François DAL - Sicavac, David LAFOND - IFV Angers, Marie Pierre DUFRESNE - FDGDON et Monique CHARLOT - FREDON
  
- Comité de lecture et de validation du BSV composé de :  
M. BADIER - CA41, AC. KASPRYK - CA37, F. DAL - SICAVAC, D. LAFFOND - IFV, MP. DUFRESNES FDGEDON, M. PROU - VitiVini, J. FILLON - LVVD, G. LALOY - Espace vigne

### **Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Viticulture région Centre sont les suivantes :**

CDA 41, CDA 37, CRAC, SICAVAC, IFV Val de Loire Centre, Viti Vini, PhytoService, Espace Vigne, Soufflet Vigne, VitAgri, COPAC, Renaud SA, LVVD, Syndicats AOC Coteaux du Vendômois, AOC Valençay, AOC Orléans, Cave des Producteurs de Montlouis, Cave des Coteaux du Vendômois, Cave des Vins de Bourgueil, Cave des Producteurs de Vouvray.

### **Ce qu'il faut retenir pour ce début de campagne 2011:**

- **Toujours dans une période très sèche ....**
- **Stade phénologique moyen : 1 à 4 feuilles étalées selon les cépages et les situations**
- **Parasites : pression faible des manges bourgeons**

## Climatologie

Rien à signaler sur l'ensemble du réseau.

## Stades phénologiques de la vigne

Les conditions climatiques des 10 derniers jours ont été très favorables au développement de la vigne notamment en fin de semaine dernière. Dans les situations et les cépages précoces, certaines parcelles peuvent être déjà au stade de 2 à 3 feuilles étalées. Nous avons environ 12 à 14 jours d'avance de végétation par rapport à 2010 et nous nous situons comme 2007.

	Stades moyens	Parcelles les plus tardives	Parcelles les plus précoces
<b>Chardonnay</b>	E08 1 à 2 feuilles étalées	D06 1ère feuille étalée	E09 2 à 3 feuilles étalées
<b>Chenin</b>	E08 1 à 2 feuilles étalées	D06 1ère feuille étalée	E09 2 à 3 feuilles étalées
<b>Sauvignon</b>	E07 1ères feuilles étalées	D06 Eclatement du bourgeon	E08 1 à 2 feuilles étalées
<b>Cabernet</b>	E08 1 à 2 feuilles étalées	D06 1ère feuille étalée	E09 2 à 3 feuilles étalées
<b>Pinot Noir</b>	E08 1 à 2 feuilles étalées	D06 1ère feuille étalée	E09 2 à 3 feuilles étalées
<b>Gamay</b>	E08 1 à 2 feuilles étalées	D06 1ère feuille étalée	E09 2 à 3 feuilles étalées
<b>Cot</b>	E07 1ères feuilles étalées	D06 Eclatement du bourgeon	E08 1 à 2 feuilles étalées

Le débourrement s'est déroulé dans de bonnes conditions et il est globalement régulier hormis quelques parcelles de Cot, un peu plus tardives où le développement des bourgeons est actuellement plus « irrégulier ».

## RAVAGEURS

### Mange Bourgeons

Nous n'avons pas observé de dégâts significatifs liés aux manges bourgeons (boarmies, chenilles bourruées, noctuelles ...) hormis deux situations à St Nicolas de Bourgueil. Nous avons atteint voire dépassé le stade de sensibilité de la vigne à ces ravageurs (1ères feuilles étalées) Le bilan des dégâts moyens enregistrés sur l'ensemble du réseau est donc globalement d'un **niveau faible à nul**.



**Chenille bourruée**

Rappel du seuil d'intervention : au moins 15 % des ceps avec au moins un bourgeon attaqué

### Acariose

Il est encore un peu tôt pour bien visualiser les symptômes, les 1ères observations débiteront la semaine prochaine

### Erinose

C'est le début de l'apparition des symptômes typiques (boursouflures colorées sur la face supérieure des feuilles) notamment les bourgeons qui sont proches du tronc et qui ont déjà atteint 2 à 3 feuilles étalées.



Sur les premières observations de parcelles les plus avancées en végétation (2 à 3 feuilles étalées) en particulier sur Chinon et St Nicolas, certaines présentent déjà des symptômes. Ces derniers n'auront aucune incidence sur le développement de la vigne.

### Tordeuses

Dans les zones précoces, le vol de 1<sup>ère</sup> génération a débuté vers le 08 avril dernier.

## Maladies cryptogamiques

### Mildiou

Les observations débuteront la semaine prochaine

#### Modèle Potentiel Système

Les 1<sup>ères</sup> données du modèle seront disponibles également à partir de la semaine prochaine

#### Maturité des œufs d'hiver

Les œufs d'hiver ne sont pas pour l'instant suffisamment mûrs pour entraîner des contaminations de masse. Le temps de germination actuel varie selon les situations de conservation des feuilles cet hiver à savoir :

- de 2.5 j sur la région de Sancerre
- à 3.5 j sur la Touraine

Rappelons que la maturité des œufs d'hiver est considérée acquise lorsque leur germination en milieu contrôlé (t°C à 20°C et humidité saturante) a lieu en moins de 24 heures or ces conditions n'existent pas au champ à cette époque.

Le manque de pluie actuellement est très défavorable aux premières contaminations.

### Oidium

Les observations débuteront la semaine prochaine

#### Modèle Potentiel Système

Les 1<sup>ères</sup> données du modèle seront disponibles également à partir de la semaine prochaine

### Black-rot

Les observations débuteront la semaine prochaine

#### Modèle Potentiel Système

Les 1ères données du modèle seront disponibles également à partir de la semaine prochaine

**Prochain BSV Viticulture Centre: mardi 19 avril 2011.**

---

Ce qu'il faut retenir ....

Cette année 2011 doit permettre de consolider le fonctionnement du réseau et le contenu du BSV grâce aux retours et remarques constructives de chacun tout au long de la campagne.

La qualité du BSV et les services qu'il pourra rendre, sont de la responsabilité de tous (lecteurs comme observateurs) !

---