

Viticulture

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Viticulture région Centre sont les suivantes :
CDA 41, CDA 37, CRAC, SICAVAC, IFV Val de Loire Centre, Viti Vini, PhytoService, Espace Vigne, Soufflet Vigne, VitAgri, COPAC, Renaud SA, LVVD, Syndicats AOC Coteaux du Vendômois, AOC Valençay, AOC Orléans, Cave des Producteurs de Montlouis, Cave des Coteaux du Vendômois, Cave des Vins de Bourgueil, Cave des Producteurs de Vouvray, Agri Négoce, Viti Négoce.

Ce qu'il faut retenir pour ce début de campagne 2012:

- Toujours dans une période très sèche et très froide ...
- Des dégâts de gel le 17/04/2012
- Stade phénologique moyen : 1 à 2 feuilles étalées selon les cépages et les situations et peu ou pas d'évolution depuis 8 jours
- Pression parasitaire : faible à nulle
- Début du vol de tordeuses en G1

Semaine n° 16

Nombre de parcelles observées : 46

Climatologie

Nous sommes toujours dans une situation très sèche actuellement avec très peu de pluies depuis plusieurs semaines sur l'ensemble du vignoble.

Accidents climatiques :

1 - Des dégâts de grêle ont été signalés le samedi 14/04/2012 sur Noyers/Cher (41), avec quelques bourgeons qui ont été détruits à l'impact d'un grêlon.



MB - 16/04/12

2 - Comme nous l'avions indiqué la semaine dernière, nous avons observé quelques dégâts de gel d'hiver sur des coursons notamment sur le vignoble de Cheverny (41), Bléré (37) et Vouvray.



MB - Plante de Sauvignon au 16/04/12

Vigne encore au stade hiver

3 – Gel de printemps : Ce matin les températures sont descendues très bas sur toutes les stations météo et jusqu'à -3.8°C à Cheverny (41) à voire plus bas notamment sur Quincy (18) et avec certainement des conséquences parfois importantes

Stades phénologiques de la vigne

Malgré un démarrage précoce de la végétation (fin mars), les conditions climatiques des 10 derniers jours sont très défavorables au développement de la vigne. Dans les situations et les cépages précoces, certaines parcelles peuvent être déjà au stade de 2 à 3 feuilles étalées. Les stades ont peu ou pas évolué durant les 8 derniers jours.

	Parcelles les plus tardives	Stades moyens	Parcelles les plus précoces
Chardonnay	D06 1ère feuille étalée	E08 1 à 2 feuilles étalées	E09 2 à 3 feuilles étalées
Chenin	D06 1ère feuille étalée	E08 1 à 2 feuilles étalées	E09 2 à 3 feuilles étalées
Sauvignon	D05 Pointe verte	E06 Eclatement du bourgeon	E08 1 à 2 feuilles étalées
Cabernet	D06 1ère feuille étalée	E08 1 à 2 feuilles étalées	E09 2 à 3 feuilles étalées
Pinot Noir	D06 1ère feuille étalée	E08 1 à 2 feuilles étalées	E09 2 à 3 feuilles étalées
Gamay	D06 1ère feuille étalée	E08 1 à 2 feuilles étalées	E09 2 à 3 feuilles étalées
Cot	D05 Pointe verte	E06 Eclatement du bourgeon	E08 1 à 2 feuilles étalées

RAVAGEURS

Mange Bourgeons

Nous n'avons pas observé de dégâts significatifs liés aux mange bourgeons (boarmies, chenilles bourruées, noctuelles ...) sur cette campagne hormis cette semaine une parcelle sur Sancerre. L'impact de ces ravageurs sur 2012 sur l'ensemble du réseau est donc globalement d'un **niveau très faible à nul**.

Evaluation des risques

Aucun risque actuellement

Acariose

Nous sommes au début de l'apparition des 1ers symptômes.

Evaluation des risques

Aucun risque actuellement

Erinose

C'est le tout début de l'apparition des 1ers symptômes typiques (boursoflures colorées sur la face supérieure des feuilles) sur les cépages précoces (Chardonnay, Cabernet, Chenin) et également sur les situations précoces notamment les bourgeons qui sont proches du tronc et qui ont déjà atteint 2 à 3 feuilles étalées.

Evaluation des risques

Aucun risque actuellement

Tordeuses

Dans les zones précoces, les 1ères prises de papillons de tordeuses du vol de 1^{ère} génération ont débuté fin de semaine dernier, ce qui est précoce.



Le piégeage : un outil pour estimer l'intensité du vol

Evaluation des risques

Aucun risque actuellement

Cochenilles

Des cochenilles (P Corni) ont été observées sur 3 parcelles du réseau notamment de Chenin à Montlouis (37) et à Limeray (37) et à Reuilly (36)



ACK 16/04/12

Evaluation des risques

Aucun risque actuellement

Maladies cryptogamiques

Comme nous l'avons précisé, le BSV s'appuie sur le réseau « Modélisation » animé par l'IFV Val de Loire – Centre pour évaluer la situation sanitaire en ce qui concerne le Mildiou, l'Oïdium et le Black-rot dans lequel des parcelles d'observation sont suivies avec des TNT (Témoins non traités) :

- ⇒ 10 sur 22 pour le 37
- ⇒ 5 sur 22 pour le 41
- ⇒ 3 sur 20 pour le 18

Mildiou

La réceptivité de la vigne : Le stade lié à la réceptivité de la vigne vis-à-vis du Mildiou est bientôt atteint

Maturité des œufs d'hiver

Les œufs d'hiver ne sont pas pour l'instant suffisamment mûrs pour entraîner des contaminations de masse. Le temps de germination actuel varie selon les situations de conservation des feuilles cet hiver à savoir :

- à + 4 j sur la Touraine, Montlouis

Rappel : la maturité des œufs d'hiver est considérée acquise lorsque leur germination en milieu contrôlé (t°C à 20°C et humidité saturante) a lieu en moins de 24 heures or ces conditions n'existent pas au champ à cette époque.

Le manque de pluie et les températures très basses actuellement sont très défavorables aux premières contaminations.

Modèle Potentiel Système et niveau de risque : le modèle confirme que les œufs ne sont pas mûrs et que le niveau de risque est faible à très faible actuellement sur tous les secteurs.

Oïdium

Les conditions météorologiques actuelles (froid...) sont très défavorables au champignon et le stade de sensibilité de la vigne n'est pas atteint (7 à 8 feuilles).

Modèle Potentiel Système et niveau de risque : Aucune contamination n'est prévue actuellement

Black-rot

La réceptivité de la vigne : Le stade éclatement du bourgeon est quasiment atteint pour tous les cépages et dans tous les vignobles. Il marque le début de la réceptivité de la vigne au Black Rot.

Modèle Potentiel Système et niveau de risque: le niveau risque est actuellement élevé et des contaminations sont possible en cas de pluies significatives sur les zones à historique.

Prochain BSV Viticulture : mardi 24 avril 2012

Ce qu'il faut retenir

Cette année 2012 doit permettre de consolider le fonctionnement du réseau et le contenu du BSV grâce aux retours et remarques constructives de chacun tout au long de la campagne.

La qualité du BSV et les services qu'il pourra rendre, sont de la responsabilité de tous (lecteurs comme observateurs) !
