

Viticulture

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Viticulture région Centre sont les suivantes :

CDA 41, CDA 37, CRAC, SICAVAC, IFV Val de Loire Centre, Viti Vini, PhytoService, Espace Vigne, Soufflet Vigne, VitAgri, COPAC, Renaud SA, LVVD, Syndicats AOC Coteaux du Vendômois, AOC Valençay, AOC Orléans, Cave des Producteurs de Montlouis, Cave des Coteaux du Vendômois, Cave des Vins de Bourgueil, Cave des Producteurs de Vouvray, Agri Négoce, Viti Négoce.

Ce qu'il faut retenir pour ce début de campagne 2012:

- Toujours dans une période très froide et maintenant humide
- Des dégâts de gel le 17/04/2012 variables selon les vignobles
- Stade phénologique moyen : 1 à 2 feuilles étalées selon les cépages et les situations et peu d'évolution depuis plus de 15 jours
- Végétation souvent rabougrie et « jaune »
- Pression parasitaire : faible à nulle
- Début du vol de tordeuses en G1

Semaine n° 17

Nombre de parcelles observées : 44

Climatologie

Nous sommes toujours dans une période froide et maintenant humide.

Pluviométrie du 01 avril au 22 avril 2012

	Chinon 37	Vouvray 37	Touraine 41	Cheverny 41	Chavignol 18	Quincy 18
Au 22/04/12	36 mm	44 mm	37 mm	38 mm	31 mm	20 mm

Accidents climatiques :

Gel de printemps du 17/04/2012 :

- Peu ou pas de dégâts sur la partie ouest du vignoble (St Nicolas, Bourgueil) sauf dans quelques situations reconnues comme gélives (bas de pente) idem dans la partie Est (Sancerre)
- Des dégâts sur Chinon (Val de Vienne) sur la Touraine Est (Montlouis, Vouvray, Amboise, Coteaux du Cher 37 et 41) idem dans le Vendomois, l'Orléanais, Cheverny, Reuilly, Quincy et Menetou Salon.



MB - Pinot Noir Reuilly (18) - 18/04/12



MB - Chardonnay St Julien (41) - 23/04/12

Grêle:

- Quelques impacts signalés dans plusieurs vignobles (Touraine, Sancerre) avec des grêlons qui ont fait « sauter » quelques bourres mais sans conséquences.

Stades phénologiques de la vigne

Malgré un démarrage précoce de la végétation (fin mars), les conditions climatiques des 15 derniers jours sont très défavorables au développement de la vigne. Dans les situations et les cépages précoces, certaines parcelles peuvent être déjà au stade de 2 à 3 feuilles étalées. Les stades ont peu ou pas évolué durant les 8 derniers jours.

	Parcelles les plus tardives	Stades moyens	Parcelles les plus précoces
Chardonnay	D07 1 ^{ère} feuille étalée	E09 1 à 2 feuilles étalées	E10 3 à 4 feuilles étalées
Chenin	D07 1 ^{ère} feuille étalée	E09 1 à 2 feuilles étalées	E10 3 à 4 feuilles étalées
Sauvignon	D05 Pointe verte	E06 Eclatement du bourgeon	E08 1 à 2 feuilles étalées
Cabernet	D07 1 ^{ère} feuille étalée	E09 1 à 2 feuilles étalées	E10 3 à 4 feuilles étalées
Pinot Noir	D07 1 ^{ère} feuille étalée	E09 1 à 2 feuilles étalées	E10 3 à 4 feuilles étalées
Gamay	D06 1 ^{ère} feuille étalée	E08 1 à 2 feuilles étalées	E09 2 à 3 feuilles étalées
Cot	D05 Pointe verte	E06 Eclatement du bourgeon	E08 1 à 2 feuilles étalées

Globalement les vignes même les plus avancées, ont un aspect rabougri et elles sont de couleur jaune citron.

RAVAGEURS

Mange Bourgeons

Nous n'avons pas observé de nouveaux dégâts significatifs liés aux mange bourgeons (boarmies, chenilles bourruées, noctuelles ...) sur cette semaine. L'impact de ces ravageurs sur 2012 sur l'ensemble du réseau est donc globalement d'un **niveau très faible à nul**. Le stade 1ères feuilles étalées constitue la fin de sensibilité à ce ravageur.

Evaluation des risques

Aucun risque

Acariose

Nous allons entrer dans la phase du début de l'apparition des 1ers symptômes. Lors de la tournée du 23/04/12, aucun symptôme n'a été encore observé. Il ne faudra pas confondre en ce début de saison les symptômes d'acariose avec des symptômes liés au froid qui donnent aux jeunes feuilles l'aspect rabougri et jaune.

Evaluation des risques

Aucun risque actuellement

Erinose

C'est le tout début de l'apparition des 1ers symptômes typiques (boursoflures colorées sur la face supérieure des feuilles) sur les cépages précoces (Chardonnay, Cabernet, Chenin) et également sur les situations précoces. Seule une parcelle du réseau à Saint Nicolas de Bourgueil présente des symptômes.

Evaluation des risques

Aucun risque actuellement

Tordeuses

Avec la poursuite actuellement d'un temps frais et humide, l'activité de vol est très faible voire quasiment nulle.

Evaluation des risques

Aucun risque actuellement

Maladies cryptogamiques

Mildiou

La réceptivité de la vigne : Le stade lié à la réceptivité de la vigne vis-à-vis du Mildiou est quasiment acquis sur toutes les parcelles (hors situation de gel).

Maturité des œufs d'hiver

Les œufs d'hiver ne sont pas pour l'instant suffisamment mûrs pour entraîner des contaminations de masse. Le temps de germination actuel varie selon les situations de conservation des feuilles cet hiver à savoir :

- de 3 j à 4 j sur la Touraine, Montlouis, Chinon, Sancerre

Rappel : la maturité des œufs d'hiver est considérée acquise lorsque leur germination en milieu contrôlé (t°C à 20°C et humidité saturante) a lieu en moins de 24 heures or ces conditions n'existent pas au champ à cette époque.

Les températures très basses actuellement sont défavorables aux premières contaminations.

Modèle Potentiel Système et niveau de risque : Le niveau de risque est faible actuellement sur tous les secteurs avec cependant une tendance à augmenter sur la Touraine Est (Amboise, Oisly), Cheverny.

Oidium

Les conditions météorologiques actuelles (froid et humide...) sont très défavorables au champignon et le stade de sensibilité de la vigne n'est pas atteint (7 à 8 feuilles).

Modèle Potentiel Système et niveau de risque : Aucune contamination n'est prévue actuellement

Black-rot

La réceptivité de la vigne : Le stade « éclatement du bourgeon » est dépassé pour tous les cépages et dans tous les vignobles, hormis pour les Sauvignon et les Cot. Il marque le début de la réceptivité de la vigne au Black Rot sous réserve qu'elle soit en situation poussante ce qui n'est pas le cas actuellement.

Modèle Potentiel Système et niveau de risque: le niveau risque est actuellement élevé et des contaminations sont possibles suite aux dernières pluies et notamment sur les zones à historique.

Prochain BSV Viticulture : mercredi 02 mai 2012

Ce qu'il faut retenir

Cette année 2012 doit permettre de consolider le fonctionnement du réseau et le contenu du BSV grâce aux retours et remarques constructives de chacun tout au long de la campagne.

La qualité du BSV et les services qu'il pourra rendre, sont de la responsabilité de tous (lecteurs comme observateurs) !