

Les éléments clés de son programme désherbage

Intervenez tôt !

- Désherber impérativement à l'automne en commençant dès la prélevée et/ou en intervenant sur des stades jeunes.
- Attention au cumul de matières actives appliquées (ex : produits à base de DFF, flufénacet, pendimétaline ou prosulfocarbe).

Réglementation prosulfocarbe

- Obligation d'utiliser des buses à injection d'air homologuées.
- Respecter des distance vis-à-vis de certaines cultures et productions non cibles.

! Certaines spécialités commerciales ne sont plus fractionnables.

Facteurs de réussite de la prélevée

- Au plus près du semis pour bénéficier de l'humidité.
- **En situation sèche, reporter à 1 feuille.**
- Efficacité réduite en sol motteux.

Facteurs de réussite de la post-levée précoce

- Appliquer à 1 feuille vraie de la culture. Plus le stade avance, plus l'efficacité diminue.
- Ne pas appliquer si une forte pluviométrie est annoncée dans les 48 heures.

Positionnement optimum et spectre d'efficacité

Matières actives	Positionnement optimum		Flore visée :
	Prélevée	Post-levée précoce	
Pendimétaline	A associer		Vulpin
Pendimétaline + Flufénacet			Vulpin (ray-grass)
Pendimétaline + DFF			Vulpin
Flufénacet + DFF	En dehors des sols drainés		Vulpin et ray-grass
Flufénacet + DFF + Aclonifen (en dehors des sols drainés)			Vulpin et ray-grass
Flufénacet + Prosulfocarbe (en dehors des sols drainés)	En dehors des sols drainés	En dehors des sols drainés	Vulpin et ray-grass
Prosulfocarbe			Ray-grass (vulpin)
Prosulfocarbe + Clodinafop		A associer	Ray-grass (vulpin)
Chlortoluron (en dehors des sols drainés)	À associer	A associer	Ray-grass (vulpin)
Chlortoluron + DFF (sur sols drainés uniquement à partir de 2 feuilles)			Ray-grass (vulpin)

Sélectivité : priorité à l'efficacité

! Mais vigilance accrue sur les conditions d'application :
bon enfouissement des graines, humidité, pluie au moment de l'application, baisse brutale des températures, gel...