

Diversifier vos choix variétaux pour limiter les risques climatiques et de contournement aux maladies

Variété	Précocité montaison = reprise de végétation au printemps	Précocité épiaison	Teneur en protéines (GPD)	Tolérance chlortoluron	Classification qualité
→ semis précoces : du 5 - 10 octobre					
Chevignon	2	6	5	Oui	BPMFp
KWS Extase	2	6	6	Oui	VRMp
LG Audace	2	5,5	7	Oui	VRMp
SU Addiction	3	6	8	Oui	VRMp
→ semis intermédiaires : à partir du 15 - 20 octobre					
Complice	2	7	5	Oui	BPMFp
Intensity	3	6,5	8	Non	VOp
Karoque	3	7	8	Oui	VOp
KWS Ultim	3	7	6	Non	VRMp
Pondor	4	6	6	Oui	VOp
→ semis tardifs : à partir du 25 octobre					
Celebrity	4	7	7	Oui	BPMFp
Prestance	6	7,5	6	Oui	VRMp
RGT Pacteo	4	6,5	9	Oui	VRMp
SY Admiration	4	6,5	5	Oui	VRMp

Source : CTPS et Arvalis Institut du Végétal

Légende

Précocité montaison : 1 → Tardif - 2 → Demi-tardif - 3 → ½ précoce - 4 → Précoce
5 → très précoce - 6 → Ultra-précoce

Précocité épiaison : 5,5 → Demi-tardif - 6 → Demi-tardif à demi-précoce -
6,5 → ½ précoce - 7 → Précoce

Teneur en protéines : Plus la note est élevée, plus la teneur en protéines est élevée

Classe qualité : BPMFp : Blé Pour la Meunerie Française
VRMp : Variété Recommandée par la Meunerie
VOp : Variété en Observation

Gestion du risque pucerons

– Levier variétal :

- . présence sur le marché de nombreuses variétés tolérantes en escourgeon ;
- . en blé tendre : une seule variété tolérante sur le marché (RGT Tweeteo).

– Le meilleur levier agronomique est le décalage de la date de semis. Mais, il ne protège pas vis-à-vis des attaques tardives.