

Désherbez sur des adventices jeunes dès 2 feuilles du maïs

Faible pression en graminées

Application de post-levée précoce (avant le stade 3 feuilles).
=> Efficacité supérieure à la prélevée.

- **Dès le stade 1 feuille** avec des produits racinaires associés.
- Matières actives utilisables : s-métolachlore, DMTAP, thiencazone-méthyl.

Stratégie de post-levée exclusive cible dicotylédones majoritaires

Commencer **tôt dès 2 feuilles du maïs**.

2 alternatives :

- ⇒ Base nicosulfuron + mesotrione complétée avec des produits d'association pour élargir le spectre sur dicotylédones difficiles (renouées...).
- ⇒ Thiencazone-méthyl : A compléter au cas par cas (restriction d'usage (DVP,...) référez-vous à l'étiquette du produit).

Stratégie ray-grass



- La **prélevée** est **indispensable**.
- En cas de **forte infestation** (>150 ray grass/m²), prévoir une **double application**.
- En post-levée, intervenir impérativement **avant le stade 3 feuilles** du ray-grass.
- L'association thiencazone-méthyl + foramsulfuron a l'efficacité la plus acceptable.



Désherbage mécanique

- Intervenir sur adventices jeunes.
- Plusieurs passages successifs souvent nécessaires.
- Dernier passage avant la fermeture du rang.
- Inadapté en présence de vivaces.

La lutte contre les vivaces : raisonner sur la rotation Solutions utilisables dans le maïs :

Chardon

→ Le clopyralid associé à de l'huile est la matière active la plus efficace.

Liserons

→ Meilleure efficacité en fractionnant en 2 passages.
Plusieurs matières efficaces : clopyralid, dicamba, fluroxypyr.
Le premier traitement doit être réalisé avant 6 feuilles du maïs.