

SITUATION HYDROLOGIQUE

- A l'échelle départementale, les services de la Direction Départementale des Territoires (DDT) édite régulièrement un bulletin de situation hydrologique (BSH) 2023. Il fait le point sur les débits des cours d'eau qui vont amener à prendre des arrêtés de restrictions d'usage de l'eau. Il est consultable [ici](#). En période d'étiage, un BSH est édité toutes les semaines.

Les conclusions du dernier BSH du 02 mai sont les suivantes :

La majorité des débits des cours d'eau (9 débits sur 15 observés) sont à la baisse sur ces 3 derniers jours (29/04, 30/04 et 01/05). De faibles pluies sont attendues pour la 1^{ère} quinzaine de mai. L'ensemble des débits reste toutefois au-dessus des seuils d'alerte pour la période d'observation de ce bulletin.

Les nappes d'eaux souterraines (sauf 2) présentes globalement des niveaux de recharge faibles à très faibles, mais avec une tendance à la hausse. La [situation des nappes de Loir-et-Cher actualisée hebdomadairement et consultable ici](#).

PRELABLE AU DECLENCHEMENT DE L'IRRIGATION

- En Zone de Restriction d'Eau, il faut établir de façon prévisionnelle la répartition de votre quota d'eau. Réserver prioritairement le volume d'eau aux cultures estivales et aux cultures contractualisées en raisonnant sur une année sèche. Le solde pourra être réparti sur les cultures irrigables au printemps avec par ordre de priorité : blé dur, pois, orge de printemps puis blé tendre. Conserver l'équivalent d'1 passage pour les levées d'automne (colza, portes graines) au cas où.

Zone de gestion volumétrique de l'eau (par l'OUGC) – Beauce Centrale et Beauce Blésoise :

Les coefficients d'attribution pour la campagne d'irrigation 2023 ont été définis lors de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Nappe de Beauce du 22 mars 2022 au regard des niveaux des nappes : **Beauce Blésoise : 0,50** **Beauce Centrale : 0,66**

- La **feuille de calcul OPTI'M3** vous aide à effectuer la répartition de votre quota selon vos cultures et vos priorités. *Demandez-la auprès de votre conseiller.*

- Attention, le démarrage précoce de l'irrigation suppose d'assumer les besoins en eau de la culture jusqu'au stade remplissage des grains notamment en sol à faible réserve en eau.


Quand déclencher l'irrigation ?

Le démarrage de l'irrigation se réfléchit selon le stade de développement de la culture et l'état hydrique du sol.

En 2023, NET-IRRIG a fait peau neuve et devient **NET-IRRIG by SEABEX** pour proposer un outil plus abouti : Interface modernisée, Carte interactive, Conservation de l'historique, Définition plus fine de son sol (périosté, ...), des prévisions à 8 jours, ...

Pour plus d'information (dont les tutoriels vidéo !) : [ICI](#)

- Pour valoriser au mieux l'eau disponible, les apports doivent être réservés à la période de forte sensibilité au stress hydrique des cultures :



Stades repères des périodes de sensibilité à la sécheresse (Source : irriguer en économisant de l'eau, CA Centre, 2013)

➤ Analyse nitrates

Tout irrigant en **zone vulnérable** doit détenir une analyse de la teneur en nitrates de son eau d'irrigation (rivière, forage, retenue, etc.)

- Cette analyse doit **dater d'au plus 4 ans**. Elle doit être réalisée par un laboratoire ou par recours à un test colorimétrique.
- La quantité d'azote apportée par l'eau d'irrigation doit être prise en compte dans le calcul de la dose à apporter à la culture. Elle est estimée par le calcul suivant :
« N » apporté par l'eau d'irrigation = (mm apportés/100) × (concentration en nitrates en mg/l /4,43).
- **Le laboratoire de la Chambre d'Agriculture effectue ce type d'analyse. Pour tout renseignement : 02.54.55.20.40.**

BILAN CLIMATIQUE ET HYDRIQUE A OUCQUES LA NOUVELLE

Périodes	Pluie (mm)	ETP (mm)	Blé	
			ETR (mm)	Déficit cumulé
Janvier	77	-	-	-
Février	4	21	9	17
Mars	83	42	26	0
Avril	50	61	58	8
Du 1 ^{er} au 09 mai	20	28	28	16
Prévisions à 10 jours				
10 au 18 mai	-	25	25	41

Sources des données : Station du réseau de la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher

Etat de la réserve utile (RU) des sols au 09 mai						
Sol	Superficiel RUmax = 75 mm RS = 25 mm		Moyen RUmax = 120 mm RS = 40 mm		Profond RUmax = 150 mm RS = 50 mm	
	RU au 09/05	Date d'irrigation conseillée	RU au 09/05	Date d'irrigation conseillée	RU au 09/05	Date d'irrigation conseillée
Blé	53 mm	-	98 mm	-	128 mm	-


- **La stratégie d'irrigation présentée ici est de maintenir le stock d'eau du sol supérieur à la réserve de survie (RS = 1/3 de la RUmax).** Au 01^{er} février la réserve utile est considérée comme entièrement rechargée.



- Les conseils sont établis à partir d'un bilan hydrique effectué basé sur le secteur pluviométrique de Oucques la Nouvelle. Privilégiez les mesures de pluie locale (pluviomètre à la parcelle). En cas de pluies différentes, retarder ou avancer les dates d'irrigations conseillées d'un jour par tranche de 3 mm.
- Prévisions météorologiques pour les 10 jours à venir :** Le ciel sera globalement couvert avec une alternance entre nuages et éclaircies mercredi, vendredi et dimanche. Des précipitations sont annoncées la semaine prochaine. Les minimales seront comprises entre 6°C et 8°C , et les températures maximales entre 10°C et 18°C.

CONSEIL SUR LES BLES, stade moyen : dernière feuille étalée à épiaison

- Les blés sont sensibles au stress hydrique à partir du stade 1 nœud pour le blé dur et 2 nœuds pour le blé tendre. Pendant la montaison, le stress hydrique peut provoquer la régression de talles.
- Privilégier l'irrigation sur le blé dur, plus sensible au stress hydrique. S'il a été décidé d'apporter au maximum 2 irrigations sur céréales, privilégier un 1^{er} passage sur la période 2/3 nœuds et le 2^{ème} passage en post floraison.
- Pour tous les sols (superficiels, moyens et profonds), la réserve en eau du sol est suffisante pour assurer l'alimentation des cultures pour au moins les 10-15 jours à venir.**



CONSEILS SUR LES POIS D'HIVER, Stade moyen : floraison

- Les pois ne valorisent bien l'eau qu'à partir du stade début floraison pour les sols superficiels et moyens, et à floraison plus une semaine en sols profonds. **Les réserves en eau des sols sont suffisantes.**

CONSEILS SUR LES ORGES ET BLES DURS DE PRINTEMPS, Stade moyen : 2 nœuds à barbes pointantes

- Pour l'orge et le blé de printemps, la période de forte sensibilité à la sécheresse se situe du **stade 2 nœuds à la floraison**. Ainsi, pour une bonne valorisation de l'eau, il faut attendre au moins le stade 1^{er} nœud en sols superficiels et 2 nœuds pour les sols moyens à profonds. **Les réserves en eau des sols sont suffisantes.**

Sarah BELLALOU (Conseillère agroenvironnement – eau)
Mail : sarah.bellalou@loir-et-cher.chambagri.fr
Tel : 02 54 55 20 07

Frédéric CADOUX (Conseiller spécialisé grandes cultures)
Mail : frederic.cadoux@loir-et-cher.chambagri.fr
Tel : 02 54 23 11 25

